

Aflubin® Plus

Афлубін® Плюс

Сироп від кашлю

- Від будь-якого кашлю:
усуває сухий та вологий кашель



ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

Визначення, склад і призначення

Завдяки унікальному комплексу полісахаридів, що міститься в рослинних екстрактах, засіб Афлубін® Плюс сироп від кашлю здатний заспокоїти кашель, попогнати подразнення та сприяє відходженню надлишку мокроти. Афлубін® Плюс сироп від кашлю заспокоює сухий та продуктивний кашель, він також корисний в якості ад'юванта для захисту дихальних шляхів, оскільки створює мукодезінівний бар'єр, здатний обмежувати контакт з подразниками і патогенними мікроорганізмами.

Механізм дії

Біль у горлі, кашель та інші гострі захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів дуже поширені, часто викликані патогенними мікроорганізмами або впливом шкідливих подразників, у тому числі з навколошнього середовища, та низькими температурами.

Афлубін® Плюс сироп від кашлю містить рослинні екстракти для захисту слизової оболонки, попогнення кашлю та діє як відхаркувальний засіб. Полісахариди, що містяться у рослинних екстрактах засобу Афлубін® Плюс сироп від кашлю, утворюють мукодезінівний гель, що має захисну дію та створює бар'єр, здатний обмежувати контакт із зовнішніми подразниками і патогенними мікроорганізмами. Через їх подібність до води, полісахариди сприяють зволоженню слизової оболонки та розрідженню слизу. Крім того, заспокійливі екстракти попогщують сухий і продуктивний кашель.

Сироп містить мед, який надає йому пріємний смак.

Склад

Модріни арабіногалактан, ісландський мох, мед, сироп фруктози, концентрат яблучного соку, подорожника екстракт, алтея екстракт, апельсиновий ароматизатор, камедь, камайр, ефірна олія солодкого апельсину, карамель.

Упаковка. 1 флакон по 175 мл з мірним ковпачком у картонній коробці з вкладеною інструкцією із застосуванням.

Способ застосування

Діти віком від 3 до 6 років: 5 мл 2 рази на день. Діти віком від 6 до 12 років: 5 мл 4 рази на день. Діти віком від 12 років та дорослі: 10 мл 4 рази на день. Ретельно збовтати перед вживанням. Щільно закрити флакон після використання. Перед застосуванням бажано проконсультуватися з лікарем.

Побічні ефекти

При дозах, необхідних для досягнення терапевтичного ефекту, ніколи не по-відомлялося про виникнення побічних реакцій. Єдиними відомими протипоказаннями є випадки індивідуальної алергії/гіперчувствливості до складових речовин. Не слід використовувати у разі відомої алергії на продукти бджильництва.

Взаємодія з біологічно активними добавками та ліками

Жодних взаємодій компонентів Афлубін® Плюс сироп від кашлю, в рекомендованих дозах, з харчовими добавками або лікарськими засобами не було виявлено.

Однак, як правило, Афлубін® Плюс сироп від кашлю рекомендується приймати за дві години до або після застосування ліків або харчових добавок. Рекомендується проконсультуватися з лікарем перед початком лікування.

Умови зберігання

Зберігайте Афлубін® Плюс сироп від кашлю в сухому місці подалі від прямих джерел тепла або світла. Зберігайте у недоступному для дітей місці. Зберігайте при температурі від 8 °C до 25 °C. Щільно закривайте флакон після використання.

Застереження та запобіжні заходи

Не застосовувати засіб дітям віком до 3 років, застосування засобу можливе тільки за рекомендацією лікаря.

Використовувати засіб протягом 2 місяців після першого відкриття флакону. Після курсу лікування рекомендується не приймати Афлубін® Плюс сироп від кашлю щонайменше 7 діб.

Не приймати у разі непереносимості засобу.

Не приймати у випадку відомої гіперчувствливості до компонентів медичного виробу.

Не використовувати засіб більш, ніж 30 днів; якщо симптоми не проходять, проконсультуйтесь з лікарем.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Дата закінчення терміну придатності

Не приймати після закінчення терміну придатності, що вказаний на упаковці. Дата закінчення терміну придатності стосується засобу при умові його зберігання у непошкоджений тарі.

Утилізація

Засіб із закінченим терміном придатності повинен бути утилізований відповідно до правил утилізації відходів місцевого органу. У будь-якому випадку не викидайте засіб або його упаковку в навколошнє.

25°C
8°C
CE 0476
UA.TR.116

C.I.I.T. С.р.л., Via Ariosto, 50/60 – 20090 Треццано Суль Навільо (Мілан) Італія/
S.I.I.T. S.r.l., Via Ariosto, 50/60 – 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI) Italy

Уповноважений представник в Україні

ТОВ «ОМЕГА ФАРМА УКРАЇНА», вул. Бориспільська, 9,
02099, м. Київ, Україна; тел. +380 (44) 220-37-74,
info@omega-pharma.com.ua

Дата останнього перегляду: Жовтень 2018.

Символи на упаковці та етикетці медичного виробу мають наступні значення:

□ Використати до

LOT Номер партії

■ Виробник

⚠ ЗАСТОРОГА!

■ Звернутися до інструкції
по застосуванню

UA.TR.116 Знак відповідності

8°C–25°C Межі температури 8°C–25°C

⚠ Переробка упаковки

CE 0476 Знак підтвердження
відповідності

175 ml

Вага нетто

LF21323B 030085332

Perrigo®